

**Instrucciones de uso
Enbrel® (en-brel)
(etanercept)
Inyectable, para uso subcutáneo
Jeringa monodosis precargada**

¿Cómo preparo y administro una inyección con la jeringa monodosis precargada de Enbrel?

Hay 2 tipos de jeringas monodosis precargadas de Enbrel:

- La jeringa monodosis precargada de 50 mg/ml contiene una dosis de 50 mg de Enbrel.
- La jeringa monodosis precargada de 25 mg/0.5 ml contiene una dosis de 25 mg de Enbrel.

Su proveedor de atención médica le dirá cuál usar.

Se puede administrar una dosis de 50 mg como una inyección utilizando una jeringa monodosis precargada de 50 mg/ml o como dos inyecciones con jeringas monodosis precargadas de 25 mg/0.5 ml. Su proveedor de atención médica le indicará si las dos inyecciones con jeringas monodosis precargadas de 25 mg/0.5 ml deben administrarse el mismo día una vez a la semana o en dos días diferentes (con 3 o 4 días de diferencia) en la misma semana.

Los niños deben pesar al menos 138 libras para usar la jeringa monodosis precargada de 50 mg/ml de Enbrel. Los niños que pesen menos de 138 libras deberán usar una forma diferente de Enbrel. La jeringa monodosis precargada de 25 mg/0.5 ml de Enbrel no debe usarse en pacientes pediátricos que pesen menos de 68 libras.

Importante: El capuchón de la aguja de la jeringa monodosis precargada está compuesto de caucho natural seco, que está hecho de látex. Informe a su proveedor atención médica si es alérgico al látex.

Conservación de su jeringa precargada de Enbrel


- Conserve la jeringa precargada de Enbrel en el refrigerador a una temperatura de entre 36 °F y 46 °F (2 °C y 8 °C).
- Conserve la jeringa precargada de Enbrel en su caja original para protegerla de la luz o contra daños físicos.
- Si es necesario, puede conservar su jeringa precargada de Enbrel a una temperatura ambiente de entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C) durante un máximo de 30 días.
 - No vuelva a colocar la jeringa precargada de Enbrel en el refrigerador una vez que haya alcanzado la temperatura ambiente.
- Deseche las jeringas precargadas de Enbrel que se hayan conservado a temperatura ambiente durante más de 30 días.
- **No** conserve la jeringa precargada de Enbrel en condiciones de calor o frío extremos. Por ejemplo, evite guardar la jeringa precargada de Enbrel en la guantera o el maletero de su vehículo.
- **No lo congele.**
- **No lo agite.**

- **Mantenga la jeringa precargada de Enbrel y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.**

Si tiene preguntas sobre la conservación, póngase en contacto con su proveedor de atención médica o llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735) para recibir más instrucciones.

Paso 1: Preparación para una inyección

1. Elija una superficie de trabajo plana, bien iluminada y limpia, por ejemplo, una mesa.
2. Saque del refrigerador la caja que contiene las jeringas precargadas de Enbrel y colóquela en la superficie de trabajo plana. Saque una jeringa precargada y colóquela sobre su superficie de trabajo. Levante la jeringa precargada de la caja con cuidado para sacarla de la caja. **No agite** la jeringa precargada de Enbrel. Coloque la caja que contiene el resto de las jeringas precargadas en el refrigerador a una temperatura de entre 36 °F y 46 °F (2 °C y 8 °C).
3. Verifique la fecha de vencimiento impresa en la jeringa precargada. Si ya ha pasado la fecha de vencimiento, **no** use la jeringa precargada y comuníquese con su farmacéutico o llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735) para obtener asistencia.
4. **No** use la jeringa precargada si falta el capuchón de la aguja o no está bien sujetado. Llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735).
5. Para que la inyección le resulte menos molesta, deje la jeringa precargada a temperatura ambiente entre 15 y 30 minutos antes de inyectar. **No** quite el capuchón de la aguja mientras espera a que alcance la temperatura ambiente. **No** caliente Enbrel de ninguna otra manera (por ejemplo, no lo caliente en un horno de microondas ni en agua caliente).
6. Sostenga la jeringa precargada con la aguja cubierta hacia abajo. Si ve burbujas en la jeringa, golpéela suavemente para que las burbujas se desplacen hacia la parte superior de la jeringa. Gire la jeringa de modo que las líneas horizontales de color violeta en el cilindro estén directamente frente a usted. Verifique que la cantidad de líquido en la jeringa se encuentre entre las líneas de color violeta. La parte superior del líquido puede formar una curva. Si la jeringa no tiene la cantidad correcta de líquido, **no** use esa jeringa. Comuníquese con su farmacéutico o llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735) para obtener ayuda.




Indicador de nivel de llenado

7. Reúna los elementos adicionales que necesite para la inyección. Estos incluyen una toallita con alcohol, un trozo de algodón o gasa y un recipiente para desechar objetos punzocortantes (ver “**Paso 4: Desecho de los suministros**”).
8. Lávese las manos con agua tibia y jabón.
9. Asegúrese de que la solución en la jeringa precargada sea transparente e incolora. Es posible que observe partículas blancas pequeñas en la solución. Estas partículas se forman por Enbrel, y esto es aceptable. Sin embargo, **no inyecte la solución si está turbia o ha cambiado de color, o si contiene partículas grandes o de color**, llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735).

Paso 2: Selección y preparación de un lugar de inyección

1. Los lugares de inyección recomendados para administrar Enbrel con una jeringa precargada son:
 - la parte delantera del centro de los muslos
 - la zona del estómago (abdomen), excepto una zona de **2** pulgadas alrededor del ombligo
 - la parte superior externa del brazo (únicamente si otra persona le aplica la inyección)




2. Cambie el lugar en cada inyección. **No** inyecte en zonas donde la piel esté sensible, roja o dura, o donde tenga un hematoma. Evite áreas con cicatrices o estrías.
3. Si tiene psoriasis, no debe inyectar directamente en manchas o lesiones cutáneas elevadas, gruesas, rojas o escamosas.
4. Para preparar el área de piel donde se inyectará Enbrel, limpie el lugar de inyección con una toallita con alcohol. **No vuelva a tocar esta área antes de administrar la inyección.**

Paso 3: Inyección de Enbrel con una jeringa precargada

No quite el capuchón de la aguja de la jeringa precargada hasta que esté preparado para inyectar.


1. Levante la jeringa precargada de su superficie de trabajo plana. Con una mano sostenga el cilindro de la jeringa precargada y quite el capuchón de la aguja con un solo movimiento, solo cuando esté preparado para inyectar. **No** deje el autoinyector sin el capuchón de la aguja durante más de **5 minutos**. Esto podría secar el medicamento.



Para evitar dañar la aguja, **no** tuerza ni doble el capuchón de la aguja mientras lo está retirando y **no** intente volver a colocar el capuchón de la aguja sobre la jeringa precargada.

Cuando quite el capuchón de la aguja, quizás vea una gota de líquido en la punta de la aguja, esto es normal. **No** toque la aguja ni permita que esta toque ninguna superficie. **No** toque ni golpee el émbolo. Si lo hace, el líquido puede derramarse.

2. Mientras sostiene la jeringa con la punta de la aguja hacia arriba, observe si tiene burbujas de aire. Si hay burbujas, golpee **suavemente** la jeringa con un dedo hasta que las burbujas de aire suban a la parte superior de la jeringa. Empuje el émbolo lentamente para expulsar las burbujas de aire de la jeringa.
3. Mientras sostiene la jeringa en una mano como un lápiz, use la otra mano para pellizcar suavemente un pliegue de piel en el lugar que limpió y sosténgalo firmemente.
4. Con un movimiento rápido, como cuando se lanza un dardo, inserte la aguja en un ángulo de 45 grados en la piel.



5. Cuando la aguja está completamente insertada en la piel, suelte la piel que está sosteniendo. Con la mano libre, sostenga la jeringa cerca de su base, para estabilizarla. Empuje lentamente el émbolo para inyectar toda la solución de Enbrel a una velocidad constante.

6. Cuando la jeringa esté vacía, extraiga la aguja de la piel, teniendo cuidado de mantener el mismo ángulo en el que la insertó. Puede haber un poco de sangrado en el lugar de inyección. Puede hacer presión con un trozo de algodón o gasa sobre el lugar de inyección durante 10 segundos. **No** frote el lugar de inyección. Si es necesario puede cubrir el lugar de inyección con un apósito adhesivo.

Paso 4: Desecho de los suministros

La jeringa no debe volver a usarse **nunca**. **Nunca** vuelva a colocar el capuchón en una aguja.

- Inmediatamente después del uso, coloque las jeringas precargadas usadas en un recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la FDA. **No** deseche las jeringas precargadas en la basura doméstica.
- Si no tiene un recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la FDA, puede usar un recipiente doméstico que:
 - esté hecho de plástico resistente,
 - pueda cerrarse con una tapa hermética/resistente a las perforaciones que impida la salida de los objetos punzocortantes,
 - se mantenga en posición vertical y sea estable durante el uso,
 - sea resistente a las fugas, y
 - esté debidamente etiquetado para advertir que contiene residuos peligrosos.
- Cuando su recipiente para eliminación de objetos punzocortantes esté casi lleno, deberá seguir las pautas de su comunidad a fin de desechar correctamente el recipiente destinado para eliminación de objetos punzocortantes. Es posible que haya leyes locales o estatales acerca de cómo desechar las jeringas y agujas usadas. Para ver más información sobre el desecho seguro de objetos punzocortantes y consultar información específica sobre el desecho de objetos punzocortantes en su estado, visite el sitio web de la FDA:
<http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>
- **No** reutilice la jeringa.
- **No** recicle la jeringa ni el recipiente para objetos punzocortantes ni los deseche en la basura doméstica.

Importante: Mantenga siempre el recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes fuera del alcance de los niños.

Un proveedor de atención médica que esté familiarizado con Enbrel deberá responder las preguntas. Llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735) o visite www.enbrel.com para obtener más información sobre Enbrel.

Estas Instrucciones de uso fueron aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.



Fabricado por:

Immunex Corporation

Thousand Oaks, CA 91320-1799

Número de licencia en EE. UU.: 1132

© 1998 – 2016, 2019-2020, 2022 Immunex Corporation. Todos los derechos reservados.

1XXXXXX – v11

Modificado: 06/2022



Este material impreso es reciclable.